

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE  
 ET DE LA FORÊT

 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
 LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



RT

## EDITION CORSE

 Bulletin Technique N°  
 du

160

21 Décembre 1989

Suite de :

"Avertissements agricoles."

Circonscription Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Corse. Ed. spéciale Corse

n°1 mars 1983

[4° Jo 43422 + P

(n°159 en nov. 89)

 \* \* \* \* \*  
 \* TRAITEMENTS D'HIVER \*

\* SUR ARBRES FRUITIERS \*

\* \* \* \*

6663

### PROTECTION DES GROSSES PLAIES DE TAILLE

Toutes les lésions sur le tronc et les branches des arbres sont des portes d'entrée pour de nombreuses maladies et certains ravageurs. Un produit protecteur peut jouer temporairement le rôle de l'écorce en attendant la cicatrisation de la plaie à condition de :

- Parer la plaie pour que les bords soient bien nets.
- Appliquer le produit le plus tôt possible après la taille.
- Ne jamais recouvrir de parties pourries ou de moignons.
- Renouveler annuellement la protection des grosses plaies qui mettent plusieurs années à se cicatriser.

### Produits utilisables

--&gt; Spécialités contenant une matière active fongicide :

- Oxyquiholeate ou oxychlorure de cuivre = ARBOCHANCRE, CICATAL BAUME, MASTIC PELTON ANTICHANCRES, MASTIC FLUIDE ANTICHANCRES GT QUINOCHANCRE S.

- triadimefon = BAYLETON pate
- fenfuram + thiabendazole = DRAWIPASS

 4° Jo.  
 43422

P 78.

0759-9633

- Spécialités ne contenant pas de produit fongicide :
- huiles végétales + résine
- goudrons de pin + résine

### MESURES PROPHYLACTIQUES

--> Eliminer par la taille tous les rameaux morts ou dépérissants ainsi que les fruits momifiés.

--> Brûler tous les déchets de taille

### TRAITEMENTS CHIMIQUES

Ces traitements sont indispensables si vous avez observé de fortes attaques de ravageurs (cochenilles, acariens, psylles, pucerons) ou de maladies (oïdium, monilia) ainsi que mousses et lichens.

L'efficacité des traitements est fonction du soin apporté à leur réalisation .

- intervenir après la taille pendant le repos complet de la végétation en absence de gel et vent.
- mouiller abondamment les végétaux.  
La bouillie doit bien ruisseler.

### PRODUITS UTILISABLES

Les produits suivants ayant le plus souvent des actions énergiques, on veillera à respecter scrupuleusement pour chaque spécialité les dosages et les conditions d'emploi préconisés par les fabricants en fonction des espèces fruitières à pépins ou à noyau et de leur âge.

\* huiles d'anthracène - Très décapantes (lichens, mousses) et ovicides (acariens, pucerons, cochenilles et chenilles diverses ...) . Elles n'existent qu'en mélange avec des colorants nitrés.

A n'utiliser qu'en plein repos de la végétation.

Spécialités commerciales : traitement d'hiver UMUPRO, ELGETIVER activé.  
Dose : 2 à 3,5 litres de produit commercial par hectolitre suivant la spécialité.

.../...

\* Huiles jaunes - Elles sont une association de colorants avec les deux catégories d'huiles citées précédemment dont elles renforcent l'action : huiles d'anthracène (voir ci-dessus) ou huiles de pétrole (DYTROL 50, SEPPIC VERGER) . **A n'employer qu'en plein hiver.**  
Dose : 2 à 3 litres de produit commercial par hectolitre.

\* Huiles de pétrole < = huiles blanches > - Propriétés voisines des précédentes mais moins décapantes , elles agissent très efficacement surtout sur les **cochenilles** mais aussi sur les oeufs d'insectes et d'acariens . Elles peuvent se mélanger avec les produits cupriques mais sont incompatibles avec les produits soufrés.  
**Utilisation possible jusqu'au débourrement.**

Spécialités commerciales : EUPHYTANE, OLIOCIN ET PEST-OIL 7 = huiles d'hiver seulement. OVIPRON = huile d'hiver et de printemps.  
Dose : 1 à 4 litres de produit commercial par hectolitre.

\* colorants nitrés < D.N.O.C. > - Ces produits inscrits au tableau A < bande rouge-orangé sur les emballages sont d'une coloration jaune intense. Ils ont des propriétés insecticides < surtout ovicides et anticryptogamiques > et **peuvent être employés jusqu'au débourrement** ex : **psylle du poirier**. A utiliser avec prudence sur nectarines et merrils.  
Spécialités commerciales : nombreuses.  
Dose : 1 litre de produit commercial par hectolitre.

\* Oléoparathion - Surtout efficace vis à vis des oeufs de divers ravageurs et des **cochenilles**.  
**A utiliser le plus près possible du débourrement.**  
Spécialités commerciales : nombreuses.

#### IMPORTANT

Attention aux dosages surtout sur arbres fruitiers à noyau. Pour les limites d'emploi de chaque spécialité se conformer à la prescription du fabricant.

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - 1989 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

P 79